



Mikrobiyal Ürünler Mikroorganizma İçeren Gübreler

Siempre

Toplam Canlı Organizma İsimleri ve Sayısı:

Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis
Bacillus pumilus, Azospirillum brasilense
Azotobacter chroococcum
Trichoderma harzianum, Trichoderma viride :
5 x 10⁸ cfu/g

Glomus intraradices:
100 spor/g

Net Ağırlık
250 gr

UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIM DÖNEMLERİ

BİTKİ	TOPRAKTAN	YAPRAKTAN	DAMLAMA	FİDE DALDIRMA
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz ve Kabak (Tarla-Sera)	Dikim ile beraber 50 g'da uygulanır. 2-3 hafta sonra ikinci uygulama aynı dozda tekrarlanır.	50-100 g / 100 L. su	Ekim ile beraber 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Ekim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Sert Çekirdekçiler (Kıraz, Kayısı, Şeftali, Erik, Vişne, Nektarin)	Çiçeklenme öncesi 50 g'da dozuya uygulanır.	50-100 g / 100 L. su	Çiçeklenme öncesi 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Fidanlar dikim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Yumuşak Çekirdekçiler (Elma, Armut, Ayva)	Çiçeklenme öncesi 50 g'da dozuya uygulanır.	50-100 g / 100 L. su	Çiçeklenme öncesi 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Fidanlar dikim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Sert Kabuklular (Ceviz, Badem, Fındık, Antep Fıstığı, vb.)	Çiçeklenme öncesi 50 g'da dozuya uygulanır.	50-100 g / 100 L. su	Çiçeklenme öncesi 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Fidanlar dikim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Narenciye (Portakal, Limon, Greyfurt, Mandalina, Nar vb.)	Çiçeklenme öncesi 50 g'da dozuya uygulanır.	50-100 g / 100 L. su	Çiçeklenme öncesi 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Fidanlar dikim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Tropikal ve Üzümşü Meyveler (Muz, Avokado, Mango, Çilek)	Çiçeklenme öncesi 50 g'da dozuya uygulanır.	50-100 g / 100 L. su	Çiçeklenme öncesi 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Fidanlar dikim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Kivi, Böğürtlen, Yaban Mersini vb.	Çiçeklenme öncesi 50 g'da dozuya uygulanır.	50-100 g / 100 L. su	Çiçeklenme öncesi 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Fidanlar dikim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Bağ ve Zeytin	Çiçeklenme öncesi 50 g'da dozuya uygulanır.	50-100 g / 100 L. su	Çiçeklenme öncesi 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Fidanlar dikim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Tarla Bitkileri (Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Fasulye vb.)	Dikim ile beraber 50 g'da uygulanır.	50-100 g / 100 L. su	Ekim ile beraber 100-200 g'da dozuya uygulanır.	
Tüm Yumrulu Bitkiler (Ş.Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsı Havuç, vb.)	Dikim ile beraber 50 g'da uygulanır.	50-100 g / 100 L. su	Ekim ile beraber 100-200 g'da dozuya uygulanır.	
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Tütün, Kekik, Lavanta vb.) ve Mantarlar	Dikim ile beraber 50 g'da uygulanır. 2-3 hafta sonra ikinci uygulama aynı dozda tekrarlanır.	50-100 g / 100 L. su	Ekim ile beraber 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Ekim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Yeşil Alan ve Kesme Çiçekçilik	Dikim ile beraber 50 g'da uygulanır. 2-3 hafta sonra ikinci uygulama aynı dozda tekrarlanır.	50-100 g / 100 L. su	Ekim ile beraber 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Ekim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.
Kışık sebze Karnabab, Brökolü, Lahana ve Marul	Dikim ile beraber 50 g'da uygulanır. 2-3 hafta sonra ikinci uygulama aynı dozda tekrarlanır.	50-100 g / 100 L. su	Ekim ile beraber 100-200 g'da dozuya uygulanır.	Ekim öncesi 6 g/1 L. su oranında hazırlanan solüsyona daldırılır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

4-25 °C arasında, doğrudan güneş ışığından uzak, kuru ve serin bir yerde ambalajı açılmadan 24 aylık canlılığı korur. Orjinal ambalajında saklayın. Güde ve hayvan yeminden ayırın. Ürünü çevreye boşaltmayın. Kanalizasyonlara veya nehirlere boşaltmayın. Ambalajı açıldıktan sonra serin ve doğrudan güneş görmeyen oda sıcaklığında 4 ay canlılığı korur.

UYARILAR - ÖNLEMLER

- PAKETİ AÇMADAN VE ÜRÜNÜ UYGULAMADAN ÖNCE TÜM ETİKETİ OKUYUNUZ
- Gıda maddeleri, içecekler ve kuru hayvan yemleri ile temas ettirmeyin.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Ürünü çevreye boşaltmayın. Drenajlara, yüzey sularına, kanalizasyona veya yeraltı sularına ATMAYINIZ.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırıldıktan gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındır.

EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK ŞARTLARI

Killi, kumlu ve tırlı topraklar için mikrobiyal gübre. Optimum toprak koşulları pH 4.0-9.0 toprak sıcaklığı 35 °C'nin altındadır.

Phyasa sunacağımız etiket ile aynı olacağına taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı Kanuna göre, hakkımızda yapılacak ceza işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



Üretim Tarihi:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2026	2027	2027	2028	2029	2030	2031					

Son kullanma tarihi, Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA



**Nutri Biotech Tarım
Son. ve Tic. Ltd. Şti.**

- Çilek Moh. 63192 SK. 33 A Akdeniz / Mersin / Türkiye
- +90 532 058 48 79

- info@nbtagro.com
- www.nbtagro.com

Parti No:

Lisans No: 3403

Tescil No: 2026T07318