

## ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

# Potassima<sup>+</sup>Ca

5-0-12 + (12 CaO) + (2 MgO) + TE

| GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ                         | W/W   | GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ             | W/W   | GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ       | W/W       |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|
| Organik Madde                                  | % 20  | Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 2   | Toplam (Humik + Fulvik) Asit | % 6       |
| Toplam Azot (N)                                | % 5   | Suda Çözünür Bor (B)               | % 0,1 | Fulvik Asit                  | % 6       |
| Nitrat Azot (N)                                | % 3,4 | Suda Çözünür Demir (Fe)            | % 0,1 | Serbest Aminoasitler         | % 8       |
| Organik Azot (N)                               | % 1,6 | Suda Çözünür Mangan (Mn)           | % 0,1 | Maksimum Klor (Cl)           | % 2       |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | % 12  | Suda Çözünür Çinko (Zn)            | % 0,1 | pH Aralığı                   | (3,5-5,5) |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)              | % 12  | Format                             | % 22  |                              |           |

### UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN                                                              | UYGULAMA DÖNEMİ                                                             | UYGULAMA DOZU           |                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                   |                                                                             | YAPRAKTAN<br>(100 L/su) | TOPRAKTAN<br>DAMLAMA (da) |
| PAMUK, MISIR, AYÇİÇEĞİ,<br>SOYA, KANOLA, YONÇA,<br>TUTUN          | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden<br>hasada kadar 2-3 kez uygulanır.       | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| DOMATES, BİBER,<br>PATLICAN, HİYAR, KABAK                         | İlk çiçeklenme ile birlikte başlanır.<br>10-15 gün ara ile uygulanır.       | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| KAVUN, KARPUZ                                                     | İlk çiçeklenme ile birlikte başlanır.<br>10-15 gün ara ile uygulanır.       | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| YABAN MERSİNİ, ÇİLEK                                              | İlk çiçeklenme ile birlikte başlanır.<br>10-15 gün ara ile uygulanır.       | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| HAVUÇ, KEREVİZ, TURP                                              | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden<br>hasada kadar 2-3 kez uygulanır.       | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| LAHANA, KARNABAHAAR,<br>BROKOLİ                                   | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden<br>hasada kadar 2-3 kez uygulanır.       | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| SOĞAN, SARIMSAK                                                   | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden<br>hasada kadar 2-3 kez uygulanır.       | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| NOHUT, MERCİMEK,<br>FASULYE, BEZELYE                              | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden<br>hasada kadar 2-3 kez uygulanır.       | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| ŞEFTALİ, KIRAZ, VIŞNE,<br>KAYISI, NEKTARIN, ERİK                  | Meyve tutumundan itibaren 20 gün<br>ara ile 3-4 kez uygulanır.              | 100-200 g               | 1-2 kg                    |
| ELMA, ARMUT, AYVA                                                 | Çiçeklenme döneminden itibaren<br>2-3 kez uygulanır.                        | 100-200 g               | 1-2 kg                    |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK,<br>CEVİZ, KESTANE                          | Çiçeklenme döneminden itibaren<br>2-3 kez uygulanır.                        | 100-200 g               | 1-2 kg                    |
| BAĞ, NAR, İNCİR, ZEYTİN                                           | Çiçeklenme döneminden itibaren<br>2-3 kez uygulanır.                        | 100-200 g               | 1-2 kg                    |
| PORTAKAL, MANDALINA,<br>LİMON, GREYFURT                           | Çiçeklenme döneminden itibaren<br>2-3 kez uygulanır.                        | 100-200 g               | 1-2 kg                    |
| MUZ                                                               | Doğum döneminden önce başlanır<br>15-20 gün ara ile uygulanır.              | 100-200 g               | 1-2 kg                    |
| ŞEKER PANCARI, PATATES                                            | Çiçeklenme ve yumru oluşumundan<br>itibaren hasada kadar 2-3 kez uygulanır. | 100-200 g               | 1-2 kg                    |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK,<br>SUS BİTKİLERİ                                | Gelişim dönemi boyunca<br>15-20 gün ara ile uygulanır.                      | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| BUĞDAY, ARPA, TRİTİKALE,<br>ÇAVDAR, YULAF, ÇELTİK,<br>YER FISTIĞI | Kardeşlenme döneminden itibaren<br>10-15 gün ara ile uygulanır.             | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |
| YEŞİL ALAN BİTKİLERİ                                              | Sezon boyunca 15-20 gün ara ile<br>2-3 kez uygulanır.                       | 100-150 g               | 0,5-1 kg                  |

### UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

### DEPOLAMA ŞARTLARI

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / +45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

### FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici firma tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanımı ve kansımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.



### Üretim Tarihi:

| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|------|------|------|------|------|---|---|---|----|----|----|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |   |   |   |    |    |    |

Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

### Parti No:

Lisans No: 3403

Tescil No: 2025T06988

ÜRETİCİ FİRMA



Nutri Biotech Tarım  
San. Tic. Ltd. Şti.

Çilek Mh. 63192 Sk.  
33 A AKDENİZ  
MERSİN / TÜRKİYE

☎ +90 532 058 48 79  
✉ info@nbtagro.com  
🌐 www.nbtagro.com

Net Ağırlık: **0,5 kg**