

EC FERTİLİZER
Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat)
Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo)
ve Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Santo Combi

UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 lt/su)	TOPRAKTAN DAMLAMA (Da)
SEFA SEBZELERİNDE	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
AÇIK TARLA SEBZELERİNDE	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
KAVUN, KARPUZ, ÇİLEK	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
ELMA, ARMUT, AYVA	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
ŞEFTALİ, KIRAZ, VIŞNE, KAYISI, NEKTARIN, ERİK	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
ÜZÜM, MUZ, NAR, İNCİR	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
NARENÇİYE, ZEYTİN, ÇAY	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
FINDIK, ÇEVİZ, ANTEP FISTIĞI, KESTANE	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
PAMUK, MISIR, AYÇİÇEĞİ, SOYA, KANOLA	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
LAHANA, TURP, HAVUÇ, KEREVİZ, KARNABAHAİR	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
TAHILLAR, BAKLAGİLLER, YEM BİTKİLERİ	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
SEKER PANCARI, PATATES, SİĞANI, SARIMSAK	Yumurta oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK, YEŞİL ALANLAR, ÇELTİK	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	150-200 mL / 100 L su	1-2 L/da

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımını, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyeti kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisine altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA



- Güvenevler Mh. 1928 Sk.
Ekinci Global İş Merkezi Kat:14
No:5/25 Yenişehir, Mersin/Türkiye
- +90 532 058 48 79
- info@nbtagro.com
- www.nbtagro.com

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,3
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,7
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 2

1L
5L
10L
20L

DEPOLAMA ŞARTLARI

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

UYARILAR

- Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ! SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



Üretim Tarihi:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023	2024	2025	2026	2027	2028						

Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Lisans No: 2535

Tescil No: 2023TK7426